



ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНСКОЙ
ПРОФИЛАКТИКИ ГОРОДА
СЕВАСТОПОЛЯ

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ

НАЧАЛЬНЫЕ СИМПТОМЫ ДИАБЕТА

ЧРЕЗМЕРНАЯ ЖАЖДА



Когда глюкоза не усваивается должным образом, ее накопление в кровотоке может привести к обезвоживанию. Это изменяет нормальное слюноотделение и усиливает ощущение жажды.

НАРУШЕНИЯ СНА



Высокий уровень сахара в крови должным образом не контролируется во времени, больной начинает испытывать постоянные перебои со сном.



ЧАСТОЕ МОЧЕИСПУСКАНИЕ



Почки работают интенсивнее, пытаются отфильтровать избыток сахара из крови. Это уменьшает способность расщеплять токсины и может вызвать другие трудности в мочевыделительной системе.

МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ




Иммунная система ослабевает, возрастает нагрузка на почки, повышается восприимчивость к инфекциям мочевыводящих путей.

МЕДЛЕННОЕ ЗАЖИВЛЕНИЕ РАН



Язвы на коже или ранки долго заживают или не заживают вовсе.

СУХАЯ КОЖА



Диабет 2 типа может вызвать проблемы с кровообращением, которые влияют на кожу: сухость, потеря эластичности.

РАЗМЫТОЕ ЗРЕНИЕ



Обезвоживание, вызванное высоким уровнем сахара в крови, может повлиять на здоровье зрения. Из-за диабета кровеносные сосуды часто повреждаются и происходит помутнение зрения.



БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!

sevmiac.ru/tsmp-home/

