

в соответствии с приложением № 1 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06 декабря 2021 г. № 1122н

[illegible]

ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНСКОЙ
ПРОФИЛАКТИКИ ГОРОДА
СЕВАСТОПОЛЯ

МАЛО - ПРОСТО ЛЮБИТЬ...



Вы можете
защитить
своего
ребёнка от
многих
инфекционных
заболеваний

ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ - ПРИВИВКА!

ЗАЩИТА РЕБЕНКА ОТ ИНФЕКЦИИ - ЗАДАЧА РОДИТЕЛЕЙ!

Чтобы помочь родителям ориентироваться в вакцинах, был создан Национальный календарь профилактических прививок. В него входят вакцины от многих инфекционных заболеваний. Ведь болеть той же ветрянкой, гепатитом В или менингитом опасно для здоровья. Это связано с осложнениями, которые могут возникнуть после болезни.

ЛУЧШЕ СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ, ЧЕМ ВСЮ ЖИЗНЬ РАЗБИРАТЬСЯ С ОСЛОЖНЕНИЯМИ

К сожалению, дети выходят в большой мир без необходимой защиты от инфекционных болезней. И любая встреча с серьезной инфекцией угрожает жизни и чревата осложнениями — иногда на многие годы, а то и на всю жизнь.

КОГДА СТОИТ ОТЛОЖИТЬ ПРИВИВКУ?

Если у ребенка высокая температура, насморк, кашель, рвота, диарея или хроническое заболевание в фазе обострения, вакцинацию нужно отложить. В случае с легкой простудой — на 2–3 дня после исчезновения симптомов. Для более длительного отвода от вакцинации необходима веская причина — например, тяжелое течение болезни.

В 25 РАЗ БЕЗОПАСНЕЕ УКУСА ПЧЕЛЫ

Для сравнения, анафилактический шок после укуса пчелы возникает в одном случае из сорока тысяч (в 25 раз чаще, чем при введении вакцины). И тем не менее многие люди опасаются делать прививки, но при этом не боятся укусов насекомых.

ЧТОБЫ СВЕСТИ К МИНИМУМУ РИСК ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ ПРИВИВКИ, НУЖНО ПРАВИЛЬНО ПОДГОТОВИТЬ РЕБЕНКА К МЕДИЦИНСКОМУ ВМЕШАТЕЛЬСТВУ

1. За 1–2 дня до вакцинации и 3–5 дней после нее не вводите в рацион новую пищу и постарайтесь избегать продуктов, которые могут вызвать аллергию: конфеты, шоколад и другие сладости, цитрусовые, ягоды и фрукты ярких цветов. На это же время лучше отложить новые средства для купания, гигиены, стирки и не начинать прием новых лекарств.
2. За несколько дней до прививки и неделю после нее лучше избегать многолюдных мест, чтобы снизить вероятность контакта с источниками инфекционных заболеваний. Так что поход в торговый центр лучше заменить прогулками на свежем воздухе.
3. В день вакцинации измерьте ребенку температуру тела с утра, а затем еще раз вечером. Запомните или запишите результаты.
4. Возьмите с собой прививочный сертификат или медкарту с данными вакцинации — это поможет врачу принять оптимальное решение, какие прививки и когда лучше сделать.
5. Если вас волнуют какие-либо вопросы по поводу вакцинации, не стесняйтесь задать их врачу — пусть он развеет ваши сомнения и даст необходимые рекомендации.
6. На всякий случай побудьте у кабинета врача еще полчаса после прививки.
7. Вечером после прививки лучше воздержаться от долгого пребывания в воде — пусть вместо ванны ребенок примет быстрый душ. Место введения вакцины лучше не вытирать, а аккуратно промокнуть полотенцем.

От каких инфекций можно защитить своего ребенка, Вы можете ознакомиться в Национальном календаре профилактических прививок на обороте буклета.



ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНСКОЙ
ПРОФИЛАКТИКИ ГОРОДА
СЕВАСТОПОЛЯ



Группы в социальных сетях:

https://vk.com/cozimp_92/



<https://t.me/sevcozimp/>



<https://ok.ru/cozimp/>

**Больше информации можно узнать
на нашем сайте:**

<http://sevmiac.ru/tsmp-home/>

